

## ACLARANDO DUDAS SOBRE NUESTRAS PRÓTESIS MAMARIAS:

Seguramente hayas oído que las prótesis texturizadas de mama han sido asociadas con el riesgo de desarrollar un linfoma anaplásico de células grandes. Si este llegará a aparecer, se situaría en la zona de alrededor de la cápsula del implante y su tratamiento consistiría únicamente en la retirada de esta. Es decir, se cura mediante cirugía sin necesidad de radiación ni quimioterapia.

Sin embargo, en Herrero Jover Médicos queremos aclarar que **el Ministerio de Salud ha declarado que la posibilidad de contraer este linfoma por tu operación mamaria es extremadamente baja**, ya que es una condición muy extraña. Concretamente, recomienda a todas las personas que se hayan realizado un aumento mamario que no se precipiten en retirar o reemplazar sus prótesis si no sienten síntomas, debido al bajo riesgo de desarrollar BIA-ALCL .

## SÍNTOMAS DEL BIA-ALCL

Es importante tener en cuenta que **el BIA-ALCL no se considera un cáncer mamario**. Este linfoma se caracteriza por la hinchazón o aumento repentino de una mama y, en algunas ocasiones, síntomas inusuales como una erupción o masa palpable y el endurecimiento del pecho. La mejor forma de detectarlo es hacer una ecografía y pruebas CD30 y ALK.

Los implantes mamarios se tienen que revisar de forma rutinaria, generalmente una vez al año. No obstante, si sientes alguno de estos síntomas, nuestro consejo es acudir a un profesional médico antes de sacar cualquier conclusión precipitada.

## NO TODO TIENE QUE SER UN LINFOMA

Ten en cuenta que la presencia de líquido rodeando la prótesis mamaria es común. Este líquido se analiza y **es benigno en muchos casos**. Se trata de seromas benignos que sí son frecuentes, a diferencia del linfoma BIA-ALCL, extremadamente inusual hasta el punto de no haber ninguna advertencia por parte del Ministerio de Salud.

**Para aclarar cualquier duda que tengas sobre tu cirugía mamaria, solicita una cita en nuestra clínica.**